

	FICHA TÉCNICA	Código	DGA-FT-001
		Versión	1
		Fecha	20/01/20
		Página 1 de 2	

Registro Nacional ICA No. 2650
Titular del Registro: AGROCHEMY SAS



GENERALIDADES

Tipo de Producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Suspensión Concentrada-SC
Ingredientes Activos:	Azoxystrobin + Flutriafol
Concentración:	250 g/L + 250 g/L
Categoría Toxicológica:	III – Ligeramente Peligroso
Cultivo:	Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de Árbol, Aji, Pimentón, Berenjena, Aji Dulce
Presentación Disponible:	1 L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

GALATEA 500 SC, es un fungicida foliar de amplio espectro con acción preventiva y curativa, además de poseer propiedades sistémicas protege completamente las hojas y brotes nuevos. Su doble mecanismo de acción actúa inhibiendo la respiración mitocondrial de los hongos a través del bloqueo de la transferencia de electrones entre el mitocondrio B y el citocromo C. Inhibe la biosíntesis del ergosterol que es esencial en la estructura de la membrana celular del hongo.

COMPOSICIÓN

Ingrediente activo:

Azoxystrobin: 250 g/L
methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate, de formulación a 20 °C.

Flutriafol: 250 g/L
(RS)-2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol, de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 L

RECOMENDACIONES DE USO

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS (cc/Ha)	(P.C.)	(P.R.)
TOMATE	TIZÓN TEMPRANO (<i>Alternaria solani</i>)	200 cc/Ha	7 Días	4 Horas
*UCHUVA				
*LULO				
*TOMATE DE ÁRBOL				
*AJÍ				

	FICHA TÉCNICA		Código	DGA-FT-001
			Versión	1
			Fecha	20/01/20
			Página 2 de 2	
*PIMENTÓN				
*BERENJENA				
*AJÍ DULCE				

P.C: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas y animales al área o cultivo tratado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación de **GALATEA 500 SC**, alternando con fungicidas sistémicos y de contacto con diferente mecanismo de acción para el manejo de la resistencia, acorde a las recomendaciones de FRAC. Para la preparación de la aspersión, vierta la cantidad recomendada de **GALATEA 500 SC** en poca agua, agite suficientemente hasta obtener una solución homogénea y complete el volumen de agua requerida agitando permanentemente.

EQUIPO Y VOLUMEN DE MEZCLA

GALATEA 500 SC se puede aplicar por vía terrestre (foliar y al suelo) ó vía aérea, en alto y bajo volumen con cualquier tipo de aspersor, dependiendo de la cantidad de caldo/ha, del método de aplicación y de la masa foliar a cubrir. CONSULTE CON EL INGENIERO AGRÓNOMO.

GALATEA 500 SC es compatible con otros plaguicidas de uso corriente en agricultura, sin embargo, se recomienda al usuario hacer una prueba previa, bajo su responsabilidad, con las mezclas planeadas para observar los aspectos físicos de la mezcla y las reacciones sobre las plantas tratadas.

GALATEA 500 SC no presenta síntomas de fitotoxicidad en cultivos de tomate, cuando es utilizado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

“El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM

01 800 09 16012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el Teléfono 288 6012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Importado y Distribuido por:

AGROCHEMY S.A.S.

Calle 10 No. 11-23 Sur Torre 7 Ofc. 627 Reserva del Sol

Mosquera - Cundinamarca.

+571 320 8350048

Elaborado por: <i>Claudia Ramírez</i>	Última Actualización:
Cargo: Coord. Asuntos Regulatorios	Enero 2020